

Leeftijd bij eerste dosis	Vaccin	Primaire Immunisatie	Intervallen tussen primaire doses	Booster	Indien eculizumab gecontinueerd	Indien eculizumab gestopt én recidief:
6 tot 8 weken	Nimenrix	Twee doses (elk 0,5 ml) <i>2+1 schema</i>	2 maanden	Ja, één dosis op de leeftijd van 14 maanden ¹	Ja, elke 3 tot 4 jaar een booster	3 tot 4 jaar na laatste Men ACWY vaccinatie een booster geven (één dosis)
2 maanden	Bexsero	Drie doses (elk 0,5 ml) <i>3+1 schema</i>	Bij 2, 3 en 4 mnd	Ja, één dosis tussen 12 en 15 maanden met een interval van ten minste 6 maanden tussen de primaire serie en de boosterdosis	Ja, elke 3 jaar een booster	3 jaar na laatste Men B vaccinatie een booster geven (één dosis)
	Nimenrix	Drie doses (elk 0,5 ml) <i>3+1 schema</i>	Bij 2, 3 en 4 mnd	Ja, één dosis tussen 12 en 15 maanden ¹	Ja, elke 3 tot 4 jaar een booster	3 tot 4 jaar na laatste Men ACWY vaccinatie een booster geven (één dosis)
3 t/m 5 maanden	Bexsero	Twee doses (elk 0,5 ml) <i>2+1 schema</i>	Bij 3 en 5 mnd	Ja, één dosis tussen 12 en 15 maanden met een interval van ten minste 6 maanden tussen de primaire serie en de boosterdosis	Ja, elke 3 jaar een booster	3 jaar na laatste Men B vaccinatie een booster geven (één dosis)
	Nimenrix	Twee doses (elk 0,5 ml) <i>2+1 schema</i>	2 maanden	Ja, één dosis tussen 12 en 15 maanden ¹ (met een interval van ten minste 6 maanden tussen de primaire serie en de boosterdosis)	Ja, elke 3 tot 4 jaar een booster	3 tot 4 jaar na laatste Men ACWY vaccinatie een booster geven (één dosis)
6 t/m 11 maanden	Bexsero	Twee doses (elk 0,5 ml) <i>2+1 schema</i>	2 maanden ²	Ja, één dosis bij 24 maanden	Ja, elke 3 jaar een booster	3 jaar na laatste Men B vaccinatie een booster geven (één dosis)
	Nimenrix	Twee doses (elk 0,5 ml) <i>2+1 schema</i>	2 maanden	Ja, één dosis met minimaal interval van 6 mnd t.o.v. eerste dosis ¹	Ja, elke 3 tot 4 jaar een booster	3 tot 4 jaar na laatste Men ACWY vaccinatie een booster geven (één dosis)
11 t/m 13 maanden	Bexsero	Twee doses (elk 0,5 ml)	2 maanden ²	Ja, één dosis na 1 tot 2 jaar	Ja, elke 3 jaar een booster	3 jaar na laatste Men B vaccinatie een booster geven (één dosis)

		<i>2+1 schema</i>				
	Nimenrix	Eén dosis (0,5 ml) <i>1+1 schema</i>	-	Ja, één dosis op de leeftijd van 14 maanden, ten minste 2 maanden na primaire vaccin ¹	Ja, elke 3 tot 4 jaar een booster	3 tot 4 jaar na laatste Men ACWY vaccinatie een booster geven (één dosis)
14 t/m 23 maanden	Bexsero	Twee doses (elk 0,5 ml) <i>2+1 schema</i>	2 maanden ²	Ja, één dosis na 1 tot 2 jaar	Ja, elke 3 jaar een booster	3 jaar na laatste Men B vaccinatie een booster geven (één dosis)
	Nimenrix³	Eén dosis (0,5 ml)	-		Ja, elke 3 tot 4 jaar een booster	3 tot 4 jaar na laatste Men ACWY vaccinatie een booster geven (één dosis)
2 t/m 18 jaar	Bexsero	Twee doses (0,5 ml)	2 maanden ²		Ja, elke 3 jaar een booster	3 jaar na laatste Men B vaccinatie een booster geven (één dosis)
	Nimenrix/ Menveo^{3,4}	Alleen indien ≥3 jaar na primaire vaccinatie in RVP: één dosis (0,5 mL)	-		Ja, elke 3 tot 4 jaar een booster	3 tot 4 jaar na laatste Men ACWY vaccinatie een booster geven (één dosis)
18 jaar en ouder	Bexsero	Twee doses (0,5 ml)	2 maanden ²		Ja, elke 3 jaar een booster	3 jaar na laatste Men B vaccinatie een booster geven (één dosis)
	Nimenrix/ Menveo	Eén dosis (0,5 ml)	-		Ja, elke 3 tot 4 jaar een booster	3 tot 4 jaar na laatste Men ACWY vaccinatie een booster geven (één dosis)

¹ Op leeftijd van 14 maanden en 14 jaar in Rijksvaccinatie-programma.

² De primaire serie van Bexsero bestaat uit twee doses. De tweede dosis kan gegeven worden tussen 2 en 6 maanden na de eerste dosis.

³ Indien niet gevaccineerd op leeftijd van 14 maanden, dan bestaat de primaire immunisatie ook uit twee doses van Nimenrix bij diagnose <5 jaar en uit één dosis van Nimenrix bij diagnose >5 jaar. Indien wel gevaccineerd op leeftijd van 14 maanden, dan geef je één dosis van Nimenrix bij diagnose <5 jaar.

⁴ Indien niet gevaccineerd op leeftijd van 14 jaar, dan bestaat de primaire immunisatie uit één dosis van Nimenrix.