

Ciclosporine afbouwen na IST

Studie	Type onderzoek	Aantal patiënten	Patiënt kenmerken	Interventie en vergelijkende behandeling	Relevante uitkomstmaten	Opmerkingen
				Follow-up (FU) duur		Kwaliteitsbeoordeling
Scheinberg et al. Am J Hematol 2014	Prospectief cohort (2003-2010) vergeleken met historisch cohort	67	Responderende patiënten 67 uit 102	Prospectief cohort: ciclosporine in 18 maanden afbouwen Historisch cohort: ciclosporine staken na 6 maanden Mediane follow up 4.9 jaar	Cumulatieve relapse-rate op 5 jaar prospectief vs historisch: 33% vs 36% In 11 van de 16 patiënten met een relaps leidde ophogen van ciclosporine tot herstel van respons Mediane periode tot relaps prospectief vs historisch: 2 jaar vs 1 jaar na start behandeling	Prospectief cohort 15% van patiënten blijft ciclosporine afhankelijk Niveau B
Saracco BJH 2007	Retrospectief 1991-1999	40	Pediatische patiënten	Langzaam of snel afbouwen	18% bleef ciclosporine afhankelijk	Niet duidelijk onder welke omstandigheden snel danwel langzaam ciclosporine werd afgebouwd Niveau C