

Tabel 2. Uitkomstdefinities voor PD-gerelateerde infecties

Katheter-gerelateerde infecties	Refractair	Therapiefalen na 2 à 3 weken (afhankelijk van de verwekker) adequate antibiotische behandeling ^a en huidpoortzorg
	Katheterinfectie-gerelateerde katheterverwijdering	Katheter verwijdering vanwege een katheter-gerelateerde infectie, die niet reageert op adequate antibiotische behandeling of chirurgische interventie
Peritonitis	Primaire genezing	Complete genezing van peritonitis zonder de volgende complicaties: relapse/recurrent peritonitis, katheter verwijdering, switch naar hemodialyse gedurende ≥ 30 dagen of overlijden t.g.v. peritonitis.
	Refractair	Peritonitis met aanhoudend troebel dialysaat of aanhoudende leukocyten in het dialysaat $> 0.1 \times 10^9/L$ na 5 dagen behandeling met adequate antibiotica. Om te kunnen spreken van een refractaire peritonitis, dienen niet-infectieuze oorzaken van troebel dialysaat te zijn uitgesloten en/of dient er sprake te zijn van herhaaldelijk positieve dialysaatkweek.
	Recurrent	Peritonitis binnen 4 weken na het afronden van adequate antibiotische behandeling ^a , maar met een ander micro-organisme
	Relapsing	Peritonitis binnen 4 weken na het afronden van adequate antibiotische behandeling ^a met hetzelfde micro-organisme of één van beide kweken negatief
	Repeat	Peritonitis meer dan 4 weken na het afronden van adequate antibiotische behandeling ^a met hetzelfde micro-organisme
	Peritonitis-geassocieerde katheter verwijdering	Verwijdering van de PD-katheter als onderdeel van de behandeling van een actuele peritonitis
	Peritonitis-geassocieerde switch naar hemodialyse	Switch van PD naar hemodialyse (ongeacht hoe lang) als onderdeel van de behandeling van een peritonitis
	Peritonitis-geassocieerd overlijden	Overlijden binnen 30 dagen na de start van een peritonitis episode of overlijden gedurende hospitalisatie vanwege een peritonitis ongeacht de oorzaak
Peritonitis-geassocieerde hospitalisatie	Hospitalisatie voor de behandeling van een peritonitis episode	

Naar: Table 1. “outcome specific definition follow peritonitis” in ISPD-peritonitis guideline recommendations: 2022 update¹.

^a adequate antibiotische behandeling is afgerond vanaf de laatste dag van antibiotica toediening.
PD: peritoneal dialysis