

Tabel 6. Mogelijke oorzaken van peritonitis

Contaminatie, die reeds 48u pre-peritonitis kan hebben plaatsgevonden, met name met huidflora

- Contaminatie tijdens connectie
- Verlies van afsluitkap of t.g.v. niet afklemmen
- Contaminatie via slangen
- Gaatje in slang of katheter (bijv. door huisdieren)
- Productdefecten

Katheter-gerelateerd, meestal met *Staphylococcus spp.* of *Pseudomonas spp.*

- Huidpoort- en tunnelinfectie
- Biofilmvorming op intern deel van de katheter ("relapsing" en "repeat" peritonitis)

Infectie vanuit tractus digestivus met enterale micro-organismen

- Translocatie van micro-organismen door obstipatie of diarree
- Diverticulitis
- Cholecystitis
- Darmischemie
- Colitis
- Maag- of darmperforatie
- Na colonoscopie, al dan niet met poliepectomie

Bacteriëmie, vaak met *Streptokokken* en *Staphylococcus spp.*

- Na tandheelkundige ingrepen
- Vanuit geïnfecteerd vreemd lichaam

Infectie vanuit gynaecologische bron, vaak met *streptokokken*, *Candida spp.*, sommige gram-negatieve staven

- Peritoneale vaginale lekkage
 - Na hysteroscopie
-