

**Praktische handreikingen ten aanzien van de behandeling van Anemie bij Chronische Nierziekte
Voorstel van Hamersvelt aug 2014**

Streefwaardes Hb in verschillende omstandigheden:

transplantabiliteit	comorbiditeit	streefwaarde Hb met EPO	
		Hb waarbij EPO gestart moet worden	Hb bij chronisch EPO
actieve infectie		geen EPO of i.v. ijzer starten	EPO en i.v. ijzer staken
onvoldoende behandelde hypertensie		geen EPO start	geen EPO dosisverhoging
tijdelijke Hb daling bij bloeding/operaties/ontsteking		geen EPO start	geen EPO dosisverhoging
transplantabel (in toekomst)	DM CVA/TIA's maligniteit 2-5 jr geleden	5.6-6.2	6.2-6.5
	andere cardiovasculaire comorbiditeit zoals -perifeer vaatlijden -behandeld coronairlijden	5.6-6.2	6.2-6.8
	geen of andere comorbiditeit	6.2-6.8	6.5-7.1 bij zeer actieve patienten tot 7.4
niet transplantabel (op medische gronden)	actuele behandelbare maligniteit of maligniteit < 2 jr geleden	5.0-5.6 bij voorkeur zonder EPO	5.6-5.9 bij voorkeur zonder EPO
	DM (hoog risico op) CVA/TIA's andere cardiovasculair comorbiditeit	5.0-5.6	5.6-6.2
	actueel coronairlijden	5.6-6.2 bij angineuze klachten tot 6.8	6.2-6.8 bij angineuze klachten tot 7.4
	geen of andere comorbiditeit	5.6-6.2	6.2-6.8 bij zeer actieve patienten tot 7.1

Hogere streefwaardes Hb bij (in toekomst) transplantabele patiënten om (mogelijk sensibiliserende) bloedtransfusies in deze groep zo veel mogelijk te voorkomen. Bovendien heeft deze groep over het algemeen minder risico bij EPO gebruik dan de (op medische gronden) niet transplantabele patiënten